

△モビコール配合内用剤LD・▼HD [内]

【重要度】 【一般製剤名】 マクロゴール 4000 (ポリエチレングリコール 4000) Macrogol 4000 【分類】 慢性便秘症治療薬 [PEG]

【単位】 △6.8523g/包 [LD], ▼13.7046g/包 [HD]

【常用量】 LD として

■2～6歳：1回1包 [最大1回2包, 1日4包まで], 1日1回 [1～3回/日] ●増量は2日以上の間隔をあげ, 増量幅は1日1包まで

■7～11歳：1回2包 [最大1回2包, 1日4包まで], 1日1回 [1～3回/日] ●増量は2日以上の間隔をあげ, 増量幅は1日1包まで

■12歳～成人：1回2包 [最大1回4包, 1日6包まで], 1日1回 [1～3回/日] ●増量は2日以上の間隔をあげ, 増量幅は1日2包まで

※LD2包=HD1包に読み替え

【用法】 1日1回■LD1包あたり約60mL (HDでは120mL) の水に溶解し, 溶解後は速やかに服用

【透析患者への投与方法】 常用量 (5)

【保存期 CKD 患者への投与方法】 常用量 (5)

【特徴】 マクロゴール 4000 及び電解質を配合した製剤で, 主にマクロゴール 4000 の物理化学的性質により高い浸透圧効果を有し消化管内に水分を保持することで用量依存的に便の排出を促進する。LD1包にマクロゴール6.5625g, 塩化ナトリウム0.1754g, 炭酸水素ナトリウム0.0893g, 塩化カリウム0.0251g含有

【主な副作用・毒性】 下痢, 腹痛, ショック, アナフィラキシー, 発疹, 血管浮腫, 嘔吐, 末梢性浮腫, 頭痛など

【安全性に関する情報】

【F】 ほとんど吸収されない (1)

【MW】 2600～3800

【透析性】 吸収されないため該当なし

【O/W 係数】

【更新日】 20220514

※正確な情報を掲載するように努力していますが、その正確性、完全性、適切性についていかなる責任も負わず、いかなる保証もいたしません。本サイトは自己の責任で閲覧・利用することとし、それらを利用した結果、直接または間接的に生じた一切の問題について、当院ではいかなる責任も負わないものとします。最新の情報については各薬剤の添付文書やインタビューフォーム等でご確認ください。

※本サイトに掲載の記事・写真などの無断転載・配言を禁じます。すべての内容は、日本国著作権法並びに国際条約により保護されています。