

▼セリンクロ錠 [内]

【重要度】 【一般製剤名】 ナルメフェン塩酸塩水和物 nalmefene hydrochloride hydrate 【分類】 アルコール依存症・飲酒量低減薬

【単位】 ▼10mg/錠

【常用量】 10mg を飲酒の1～2時間前に投与 [最大20mg]

【用法】 1日1回

【透析患者への投与方法】

【保存期 CKD 患者への投与方法】 減量の必要はないが、高度の腎障害患者に20mgを投与すると血中濃度が過度に上昇するおそれがあり慎重に観察 (1)

【特徴】 μ オピオイド受容体拮抗薬

【主な副作用・毒性】

【安全性に関する情報】 QT 延長には関連しない (Matz J, et al: Clin Drug Investig 2011 PMID: 21967071)

【F】 41% [絶食時] (1) 食後 53% (Kyhl LE, et al: Br J Clin Pharmacol 81: 290-300, 2016 PMID: 26483076)

【tmax】

【代謝】 UGT2B7 により未変化体のグルクロン酸抱合体に代謝され、一部は CYP3A4/5 により脱アルキル化体に代謝 (1)

【排泄】 尿中未変化体排泄率 3%, 尿中回収率 70% [po] (1)

【CL】 60.4L/hr (Kyhl LE, et al: Br J Clin Pharmacol 81: 290-300, 2016 PMID: 26483076)

【t1/2】 12hr (1)

【蛋白結合率】

【Vd】 266L/man (Kyhl LE, et al: Br J Clin Pharmacol 81: 290-300, 2016 PMID: 26483076)

【MW】 411.92

【透析性】

【O/W 係数】

【相互作用】 オピオイド系薬剤と作用拮抗するため併用禁忌 (もしくは併用注意) (1)

【肝障害患者への投与方法】

【小児 CKD 患者における報告】

【妊婦・授乳婦への投薬】

【主な臨床報告】

【更新日】 20200708

※正確な情報を掲載するように努力していますが、その正確性、完全性、適切性についていかなる責任も負わず、いかなる保証もいたしません。本サイトは自己の責任で閲覧・利用することとし、それらを利用した結果、

直接または間接的に生じた一切の問題について、当院でいかなる責任も負わないものとします。最新の情報については各薬剤の添付文書やインタビューフォーム等でご確認ください。

※本サイトに掲載の記事・写真などの無断転載・配信を禁じます。すべての内容は、日本国著作権法並びに国際条約により保護されています。