

△テリルベジーエリプタ [外]

【重要度】 【一般製剤名】 フルチカゾンフランカルボン酸エステル／ウメクリジニウム臭化物／ビランテロールトリフェニル酢酸塩 Fluticasone Furoate／Umedinidium Bromide／Vilanterol Trifenatate 【分類】 COPD 治療薬 [ICS+LAMA+LABA]

【単位】 △100・△200・14 吸入用本

【常用量】

●100 (COPD, BA)

1 日 1 吸入

●200 (BA)

1 日 1 吸入 (フルチカゾンが 200 μ g)

【用法】 1 日 1 回 (コントローラーとして使用) ※吸入後うがいする

【透析患者への投与方法】 常用量 (1)

【保存期 CKD 患者への投与方法】 常用量 (1)

【特徴】 吸入ステロイド剤, 長時間作用性吸入抗コリン剤, 長時間作用性吸入 β 2 刺激剤の併用が必要な場合に適用.

【主な副作用・毒性】

【安全性に関する情報】

【F】

【tmax】

【代謝】

【排泄】

【t1/2】

【蛋白結合率】

【Vd】

【MW】

【透析性】

【OW 係数】

【肝障害患者への投与方法】

【小児 CKD 患者における報告】

【妊婦・授乳婦への投薬】

【主な臨床報告】

【更新日】 20211202

※正確な情報を掲載するように努力していますが、その正確性、完全性、適切性についていかなる責任も負わず、いかなる保証もいたしません。本サイトは自己の責任で閲覧・利用することとし、それらを利用した結果、直接または間接的に生じた一切の問題について、当院でいかなる責任も負わないものとします。最新の情報は各薬剤の添付文書やインタビューフォーム等でご確認ください。

※本サイトに掲載の記事・写真などの無断転載・配信を禁じます。すべての内容は、日本国著作権法並びに国際条約により保護されています。