

△ゾルトファイ配合注 [注]

【重要度】 【一般製剤名】 インスリン デグルデク/リラグルチド Insulin Degludec/Liraglutide 【分類】 糖尿病治療薬 [持効型溶解インスリンアナログ+ヒトGLP-1 アナログ配合注]

【単位】 △デグルデク 300 単位+リラグルチド 10.8mg/本 [3mL]

【常用量】 ■1 ドーズ = デグルデク 1 単位+リラグルチド 0.036 mg

■初期 10 ドーズ ■最大 50 ドーズ

■前治療のインスリン量により、最大 16 ドーズから開始可

【用法】 1 日 1 回、一定の時刻に皮下注

■空打ち 2 ドーズ

【透析患者への投与方法】 低血糖に注意して適用 (1)

【保存期 CKD 患者への投与方法】 低血糖に注意して適用 (1)

【特徴】 トレスーバとピクトーザの配合注。インスリン療法が適応となる 2 型糖尿病に適用 (1 型には不可)。

【主な副作用・毒性】 各成分参照

【相互作用】 GLP-1 アナログによるワルファリンの効果増強の報告 (1)

【備考】 A 型専用注射針。使用中は室温 (30°C 以下) にキャップ等により遮光して保管し 3 週間以内に使用。25°C 以下の保管であれば 4 週間以内に使用 (1)

【更新日】 20220809

※正確な情報を掲載するように努力していますが、その正確性、完全性、適切性についていかなる責任も負わず、いかなる保証もいたしません。本サイトは自己の責任で閲覧・利用することとし、それらを利用した結果、直接または間接的に生じた一切の問題について、当院ではいかなる責任も負わないものとします。最新の情報については各薬剤の添付文書やインタビューフォーム等でご確認ください。

※本サイトに掲載の記事・写真などの無断転載・配信を禁じます。すべての内容は、日本国著作権法並びに国際条約により保護されています。