

▼バスタレルF錠 [内]

【重要度】 【一般製剤名】 トリメタジジン塩酸塩 Trimetazidine Hydrochloride 【分類】 虚血性心疾患治療剤

【単位】 ▼3mg/錠

【常用量】 1回 3mg, 1日 3回

【用法】 1日 3回

【透析患者への投与方法】

【保存期 CKD 患者への投与方法】 高齢者, 腎機能低下患者で AUC 増大 (Nenchev N, et al: Drug Dev Res 2020 PMID: 32128844)

【特徴】

【主な副作用・毒性】 頭痛, 倦怠感, ふらつき, 消化器症状, 過敏症など

【安全性に関する情報】 抗酸化ストレス作用により水銀による腎毒性を軽減 (Hazelhoff MH, et al: Pharmacology 2021 PMID: 33849026)

【F】

【tmax】 2hr (1)

【代謝】 グルクロン酸抱合を受ける (1)

【排泄】 尿中未変化体排泄率 60% [po, 48hr まで] (1)

【t1/2】 11.5hr (1)

【蛋白結合率】

【Vd】

【MW】 339.26 [salt]

【透析性】

【OW 係数】

【pKa】 4.86

【肝障害患者への投与方法】

【小児 CKD 患者における報告】

【妊婦・授乳婦への投薬】

【主な臨床報告】

【更新日】 20210506

※正確な情報を掲載するように努力していますが、その正確性、完全性、適切性についていかなる責任も負わず、いかなる保証もいたしません。本サイトは自己の責任で閲覧・利用することとし、それらを利用した結果、直接または間接的に生じた一切の問題について、当院でいかなる責任も負わないものとします。最新の情報については各薬剤の添付文書やインタビューフォーム等でご確認ください。

※本サイトに掲載の記事・写真などの無断転載・配信を禁じます。すべての内容は、日本国著作権法並びに国際条約により保護されています。