

▼ピフェルトロ錠 [内]

【重要度】 【一般製剤名】 ドラビリン Doravirine 【分類】 抗 HIV 薬 [NNRTI]

【単位】 ▼100mg/錠

【常用量】 100mg/日

【用法】 1日1回

【透析患者への投与方法】 検討されていない (1)

【保存期 CKD 患者への投与方法】 常用量 (1)

【特徴】

【主な副作用・毒性】

【安全性に関する情報】

【吸収】 食事の影響を受けない (1)

【F】 64% (1)

【tmax】

【代謝】 CYP3A4 で代謝 (1)

【排泄】 尿中未変化体排泄率 6% (1)

【CL/F】 6.34L/hr [po] (1)

【t1/2】 15hr (1)

【蛋白結合率】 76% (1)

【Vd/F】 162L/man [po] (1)

【MW】 425.75

【透析性】 資料なし (1) 除去率は低いと思われる (5)

【O/W 係数】

【相互作用】 リファブチン併用時は100mg×2/日に増量 (1)

【肝障害患者への投与方法】

【小児 CKD 患者における報告】

【妊婦・授乳婦への投薬】

【主な臨床報告】

【更新日】 20201212

※正確な情報を掲載するように努力していますが、その正確性、完全性、適切性についていかなる責任も負わず、いかなる保証もいたしません。本サイトは自己の責任で閲覧・利用することとし、それらを利用した結果、直接または間接的に生じた一切の問題について、当院ではいかなる責任も負わないものとします。最新の情報については各薬剤の添付文書やインタビューフォーム等でご確認ください。

※本サイトに掲載の記事・写真などの無断転載・配信を禁じます。すべての内容は、日本国著作権法並びに国際条約により保護されています。