

○ヘパリン Ca 皮下注シリンジ [注]

【重要度】 【一般製剤名】 【分類】

【単位】 ○5000 単位/本 [0.2mL シリンジ]

【常用量】

■治療

初回 15,000～20,000 単位, 以後 1 回 10,000～15,000 単位を 1 日 2 回, 12 時間間隔で皮下注

■予防

1 回 5,000 単位を 12 時間間隔で 7～10 日間皮下注

【用法】 皮下注

【透析患者への投与方法】

【保存期 CKD 患者への投与方法】

【特徴】

【主な副作用・毒性】

【安全性に関する情報】

【E】

【tmax】 抗 Xa 活性として 2.7hr (1)

【代謝】

【排泄】

【t1/2】

【蛋白結合率】

【Vd】

【MW】

【透析性】

【O/W 係数】

【肝障害患者への投与方法】

【小児 CKD 患者における報告】

【妊婦・授乳婦への投薬】

【主な臨床報告】

【更新日】 20210325

※正確な情報を掲載するように努力していますが、その正確性、完全性、適切性についていかなる責任も負わず、いかなる保証もいたしません。本サイトは自己の責任で閲覧・利用することとし、それらを利用した結果、直接または間接的に生じた一切の問題について、当院でいかなる責任も負わないものとします。最新の情報については各薬剤の添付文書やインタビューフォーム等でご確認ください。

※本サイトに掲載の記事・写真などの無断転載・配信を禁じます。すべての内容は、日本国著作権法並びに国際条約により保護されています。