

---

**▼5-FU 軟膏協和 [外]**

---

【重要度】 【一般製剤名】フルオロウラシル (U) fluorouracil 【分類】抗腫瘍外用剤

【単位】▼5g/本 [5%]

【用法】適量を1日1~2回患部に塗布。原則として密封法 (ODT) を行うのが望ましい

【透析患者への投与方法】常用量 (1)

【保存期 CKD 患者への投与方法】常用量 (1)

【特徴】ピリミジン拮抗性抗腫瘍剤で広い抗癌スペクトラムを有し、各種皮膚悪性腫瘍に有効。

【主な副作用・毒性】疼痛、色素沈着、発赤、局所の出血傾向、爪の変形・変色、皮膚炎、光線過敏症

【F】5~6%が経皮的に吸収 (U)

【排泄】病態皮膚塗布により尿中に15.8~61.2%回収 (1)

【MW】130.08

【更新日】20150825

---

※正確な情報を掲載するように努力していますが、その正確性、完全性、適切性についていかなる責任も負わず、いかなる保証もいたしません。本サイトは自己の責任で閲覧・利用することとし、それらを利用した結果、直接または間接的に生じた一切の問題について、当院ではいかなる責任も負わないものとします。最新の情報については各薬剤の添付文書やインタビューフォーム等でご確認ください。

※本サイトに掲載の記事・写真などの無断転載・配信を禁じます。すべての内容は、日本国著作権法並びに国際条約により保護されています。