

▼ビラフトピカプセル

【重要度】 【一般製剤名】 エンコラフェニブ Encorafenib 【分類】 抗悪性腫瘍剤 [BRAF 阻害剤]

【単位】 ▼50mg・▼75mg/Cap

【常用量】 ■悪性黒色腫：450mg/日（ビニメチニブとの併用）

■結腸・直腸癌：300mg/日（セツキシマブとの併用，またはビニメチニブおよびセツキシマブとの併用）

いずれも発現した副作用グレードにより適宜減量

【用法】 1日1回

【透析患者への投与方法】

【保存期 CKD 患者への投与方法】

【特徴】

【主な副作用・毒性】 眼障害，心機能障害，肝機能障害，消化器症状，高血圧など

【安全性に関する情報】

【吸収】 AUC は食事の影響を受けない (1)

【F】

【tmax】

【代謝】 CYP3A4 による N-脱アルキル化とその後のグルクロン酸抱合により代謝 (1) 一部 CYP2C19, 2D6 も関与 (1)

【排泄】 尿中未変化体排泄率 1.8% [po, 48hr まで] (1) P-gp の基質 (1)

【t1/2】

【蛋白結合率】 86.1% (1)

【Vd】

【MW】 540.01

【透析性】

【O/W 係数】

【相互作用】 多数の CYP，トランスポーター，UGT1A1 を阻害 (1)

【肝障害患者への投与方法】

【小児 CKD 患者における報告】

【妊婦・授乳婦への投薬】

【主な臨床報告】

【更新日】 20210728

※正確な情報を掲載するように努力していますが、その正確性、完全性、適切性についていかなる責任も負わず、いかなる保証もいたしません。本サイトは自己の責任で閲覧・利用することとし、それらを利用した結果、直接または間接的に生じた一切の問題について、当院でいかなる責任も負わないものとします。最新の情報については各薬剤の添付文書やインタビューフォーム等でご確認ください。

※本サイトに掲載の記事・写真などの無断転載・配信を禁じます。すべての内容は、日本国著作権法並びに国際条約により保護されています。