

▼サークリサ点滴静注 [注]

【重要度】 【一般製剤名】 【分類】

【単位】

【常用量】

1回 10mg/kg, 20日間を1サイクルとし、最初のサイクルは1週間間隔で4回(1, 8, 15, 22日目), 2サイクル以降は2週間間隔で2回(1, 15日目)に点滴静注
[ポマリドミド及びデキサメタゾンと併用]

【用法】 生食または5%ブドウ糖でトータル250mLとして点滴静注。投与速度の指定あり添付文書参照

infusion reaction への対応のため、premedication あり

【透析患者への投与方法】

【保存期 CKD 患者への投与方法】

【特徴】 再発又は難治性の多発性骨髄腫

【主な副作用・毒性】

【安全性に関する情報】

【F】

【tmax】

【代謝】

【排泄】

【t1/2】

【蛋白結合率】

【Vd】

【MW】

【透析性】

【O/W 係数】

【肝障害患者への投与方法】

【小児 CKD 患者における報告】

【妊婦・授乳婦への投薬】

【主な臨床報告】

【更新日】 20211019

※正確な情報を掲載するように努力していますが、その正確性、完全性、適切性についていかなる責任も負わず、いかなる保証もいたしません。本サイトは自己の責任で閲覧・利用することとし、それらを利用した結果、直接または間接的に生じた一切の問題について、当院ではいかなる責任も負わないものとします。最新の情報については各薬剤の添付文書やインタビューフォーム等でご確認ください。

※本サイトに掲載の記事・写真などの無断転載・配信を禁じます。すべての内容は、日本国著作権法並びに国際条約により保護されています。