

△コレミナール錠 [内] <2025.3販売中止>

【重要度】 【一般製剤名】フルタゾラム flutazolam 【分類】消化管機能安定剤

【単位】△4mg/錠

【常用量】12mg/日

【用法】1日3回

【透析患者への投与方法】減量の必要なし (5)

【保存期 CKD 患者への投与方法】減量の必要なし (5)

【特徴】薬理作用はジアゼパムに比較して弱いが消化器症状（胃炎、消化性潰瘍）を主症状とする心身症に有効性を示す

【主な副作用・毒性】依存性、禁断症状、せん妄、眼気、立ちくらみ、めまい、倦怠感、肝機能検査値異常、消化器症状、排尿困難など

【吸収】Ka=6.7/hr (1)

【tmax】1hr (1)

【代謝】肝でオキサゾリジン環の開環脱離、N-脱アルキル化、水酸化、側鎖の酸化などにより代謝され、一部はグルクロロン酸抱合される (1)

【排泄】24hrまでに20~37%が尿中に排泄されるが、未変化体の割合は不明 (1) 【CL/F】204L/hr (1)

【t1/2】3.5hr (1)

【蛋白結合率】91% (1)

【Vd/F】690L/man (1)

【MW】376.81

【透析性】蛋白結合率が高いため、透析で除去されにくいと思われる (5) 資料なし (1)

【TDM のポイント】TDM の対象にならない 【pKa】5.40 (1)

【更新日】20250315

※正確な情報を掲載するように努力していますが、その正確性、完全性、適切性についていかなる責任も負わず、いかなる保証もいたしません。本サイトは自己の責任で閲覧・利用することとし、それらを利用した結果、直接または間接的に生じた一切の問題について、当院ではいかなる責任も負わないものとします。最新の情報については各薬剤の添付文書やインタビューフォーム等でご確認ください。

※本サイトに掲載の記事・写真などの無断複数・配信を禁じます。すべての内容は、日本国著作権法並びに国際条約により保護されています。