

○コートロシン注射用 [注]

【重要度】 【一般製剤名】 テトラコサクトド酢酸塩 Tetracosactide Acetate 【分類】 副腎皮質機能検査用薬 [合成 ACTH]

【単位】 0.25mg/V [生食 2mL 付]

【常用量】 1 日 1 回添付溶解液に溶解し、下記量を使用する。必要があれば連続 2~3 日行う。

○筋注・静注には、テトラコサクトドとして 0.25mg を使用する。

○点滴静注にはテトラコサクトドとして 0.25~0.5mg を 5%ブドウ糖注射液、生理食塩液、注射用水などに加え、4~8 時間点滴静脈内注入する。

【用法】

【透析患者への投与方法】

【保存期 CKD 患者への投与方法】

【特徴】

【主な副作用・毒性】

【安全性に関する情報】

【F】

【tmax】

【代謝】

【排泄】

【t1/2】

【蛋白結合率】

【Vd】

【MW】 3293.75

【透析性】

【OW 係数】

【肝障害患者への投与方法】

【小児 CKD 患者における報告】

【妊婦・授乳婦への投薬】

【主な臨床報告】

【更新日】 20211202

※正確な情報を掲載するように努力していますが、その正確性、完全性、適切性についていかなる責任も負わず、いかなる保証もいたしません。本サイトは自己の責任で閲覧・利用することとし、それらを利用した結果、

直接または間接的に生じた一切の問題について、当院でいかなる責任も負わないものとします。最新の情報については各薬剤の添付文書やインタビューフォーム等でご確認ください。

※本サイトに掲載の記事・写真などの無断転載・配信を禁じます。すべての内容は、日本国著作権法並びに国際条約により保護されています。