

▼ミグリステン錠 [内]

【重要度】 【一般製剤名】ジメトチアジン メシル酸塩 Dimetotiazine Mesilate 【分類】片頭痛・緊張性頭痛治療剤

【単位】▼20mg/錠

【常用量】60mg/日 [最大 120mg]

【用法】1日3回

【透析患者への投与方法】常用量 (1)

【保存期 CKD 患者への投与方法】常用量 (1)

【特徴】抗ヒスタミン作用, 抗セロトニン作用を有するフェノチアジン系薬物.

【主な副作用・毒性】発疹, 光線過敏, 色素沈着, めまい, ふらつき, 眠気, 振せん, 消化器症状, 乳房痛など

【安全性に関する情報】

【F】

【tmax】

【代謝】代謝を受ける. 酸化, 水酸化, グルクロン酸抱合による (1)

【排泄】尿中未変化体排泄率 0.03% [ラット] (1)

【t1/2】

【蛋白結合率】

【Vd】

【MW】487.66 [salt]

【透析性】

【OW 係数】3.09 [1-オクタノール/buffer, pH4.3] (1)

【肝障害患者への投与方法】

【小児 CKD 患者における報告】

【妊婦・授乳婦への投薬】

【主な臨床報告】

【更新日】20230509

※正確な情報を掲載するように努力していますが、その正確性、完全性、適切性についていかなる責任も負わず、いかなる保証もいたしません。本サイトは自己の責任で閲覧・利用することとし、それらを利用した結果、直接または間接的に生じた一切の問題について、当院でいかなる責任も負わないものとします。最新の情報については各薬剤の添付文書やインタビューフォーム等で確認ください。

※本サイトに掲載の記事・写真などの無断転載・配信を禁じます。すべての内容は、日本国著作権法並びに国際条約により保護されています。