

## ○プレベナー13 水性懸濁注 [注] &lt;販売中止&gt;

【重要度】 【一般製剤名】 沈降 13 価肺炎球菌結合型ワクチン（無毒性変異ジフテリア毒素結合体） 【分類】 ワクチン製剤 [PCV13]

【単位】

【常用量】

■高齢者：1回 0.5mL を筋注

■小児：○初回免疫：1回 0.5mL ずつを3回、いずれも27日間以上の間隔で皮下注

○追加免疫：1回 0.5mL を1回皮下注（3回目接種から60日間以上の間隔をおく）

【用法】成人は筋注、小児は皮下注

【透析患者への投与方法】常用量（1）

【保存期 CKD 患者への投与方法】常用量（1）

【特徴】13 価肺炎球菌結合型ワクチン。ニューモバックス（PPSV23）より免疫誘導が優れる。PPSV23 の定期接種を妨げないように、本剤を先に接種し、6 か月～1 年の間隔をあけて PPSV23 を接種する方法も考慮される。PPSV23 接種からは1年以上あける。

【主な副作用・毒性】

【安全性に関する情報】

【E】

【tmax】

【代謝】

【排泄】

【t1/2】

【蛋白結合率】

【Vd】

【MW】

【透析性】

【O/W 係数】

【肝障害患者への投与方法】

【小児 CKD 患者における報告】

【妊婦・授乳婦への投薬】

【主な臨床報告】

【更新日】20241012

※正確な情報を掲載するように努力していますが、その正確性、完全性、適切性についていかなる責任も負わず、いかなる保証もいたしません。本サイトは自己の責任で閲覧・利用することとし、それらを利用した結果、直接または間接的に生じた一切の問題について、当院でいかなる責任も負わないものとします。最新の情報については各薬剤の添付文書やインタビューフォーム等でご確認ください。

※本サイトに掲載の記事・写真などの無断転載・配信を禁じます。すべての内容は、日本国著作権法並びに国際条約により保護されています。