▼レクビオ皮下注シリンジ　[注]

【重要度】　【一般製剤名】インクリシランナトリウム　Inclisiran Sodium　【分類】持続型 LDL コレステロール低下 siRNA 製剤
【単位】▼300mg/Syr
【常用量】1 回 300mg を初回，3 ヵ月後に皮下注し，以後 6 ヵ月毎に皮下注［原則スタチン併用］
家族性高コレステロール血症，高コレステロール血症で，CV イベントリスクが高く，スタチンで効果不十分かスタチン治療が選択できないケースに適用
（LDL-C 70 未満を目標）
【用法】皮下注
【透析患者への投与方法】腎機能低下例では血中濃度は高くなるが，常用量の適用が可能と思われる（5）
【保存期 CKD 患者への投与方法】腎機能低下例では血中濃度は高くなるが，常用量の適用が可能と思われる（5）
【特徴】PCSK9 mRNA を標的とした二本鎖の低分子干渉リボ核酸（siRNA）．センス鎖に結合する 3 分岐型 N-アセチルガラクトサミンを介して肝臓に取り込まれ，肝臓の PCSK9 mRNA の分解を促進し，肝細胞上の LDL 受容体の発現は増加し LDL-C の取り込みが促進され，血中 LD-C 値は低下.
【主な副作用・毒性】注射部位反応，注射部位紅斑，肝機能障害
【安全性に関する情報】
【F】
【tmax】
【代謝】ヌクレアーゼで加水分解を受ける（1）
【排泄】尿中未変化体排泄率 16%［sc］（1）
【t1/2】
【蛋白結合率】
【Vd】
【MW】17,284.72
【透析性】
【O/W 係数】
【肝障害患者への投与方法】
【小児 CKD 患者における報告】
【妊婦・授乳婦への投薬】
【主な臨床報告】
【更新日】20231014

※正確な情報を掲載するように努力していますが、その正確性、完全性、適切性についていかなる責任も負わず、いかなる保証もいたしません。本サイトは自己の責任で閲覧・利用することとし、それらを利用した結果、直接または間接的に生じた一切の問題について、当院ではいかなる責任も負わないものとします。最新の情報については各薬剤の添付文書やインタビューフォーム等でご確認ください。
※本サイトに掲載の記事・写真などの無断転載・配信を禁じます。すべての内容は、日本国著作権法並びに国際条約により保護されています。