

## ◎SP トローチ明治 [外]

【重要度】 【一般製剤名】 デカリニウム塩化物 dequalinium chloride 【分類】 口腔用剤

【単位】 ◎0.25mg/錠

【常用量】 6 個/日

【用法】 1 日 6 回

【透析患者への投与方法】 減量の必要なし (5)

【保存期腎不全患者への投与方法】 減量の必要なし (5)

【特徴】 咽頭炎、扁桃炎、口内炎、抜歯創を含む口腔創傷の感染予防に適用。グラム陽性菌、陰性菌、真菌等に抗菌力を示し、唾液、血清による抗菌力の低下はほとんど認められないという。

【主な副作用・毒性】 過敏症

【MW】 527.58

【備考】 約 5kcal/錠

【更新日】 20120920

※正確な情報を掲載するように努力していますが、その正確性、完全性、適切性についていかなる責任も負わず、いかなる保証もいたしません。本サイトは自己の責任で閲覧・利用することとし、それらを利用した結果、直接または間接的に生じた一切の問題について、当院でいかなる責任も負わないものとします。最新の情報については各薬剤の添付文書やインタビューフォーム等でご確認ください。

※本サイトに掲載の記事・写真などの無断転載・配信を禁じます。すべての内容は、日本国著作権法並びに国際条約により保護されています。