

▼ストロカイン錠 [内]

【重要度】 【一般製剤名】 オキセサゼイン oxethazaine 【分類】 胃粘膜局所麻酔剤

【単位】 ▼5mg/錠

【常用量】 15～40mg/日

【用法】 分3～4

【透析患者への投与方法】 透析患者の投与方法に言及した文献はないが、減量の必要はないと思われる (5)

【保存期腎不全患者への投与方法】 減量の必要はないと思われる (5)

【特徴】 酸性化で消化管粘膜の局所麻酔作用を発揮する。ガストリンの遊離を抑制し、二次的に胃酸分泌を抑制する作用を有し、胃炎、消化性潰瘍などの消化管疾患に伴う悪心、嘔吐、胸やけなどの自覚症状を改善する。嚙み砕くと口内にしびれ感が残ることがあるため、嚙み砕いて服用しないよう注意させる。

【主な副作用・毒性】 過敏症, 消化器症状, めまい, 頭痛, 眠気など

【tmax】 4hr (ラット) (1)

【代謝】 主に肝で代謝される (1)

【排泄】 糞中, 尿中, 呼気中に排泄 (1) 尿中回収率21% (1)

【MW】 467.64

【透析性】 データなし (1)

【TDMのポイント】 TDMの対象にはならない

【更新日】 20121029

※正確な情報を掲載するように努力していますが、その正確性、完全性、適切性についていかなる責任も負わず、いかなる保証もいたしません。本サイトは自己の責任で閲覧・利用することとし、それらを利用した結果、直接または間接的に生じた一切の問題について、当院でいかなる責任も負わないものとします。最新の情報については各薬剤の添付文書やインタビューフォーム等でご確認ください。

※本サイトに掲載の記事・写真などの無断転載・配信を禁じます。すべての内容は、日本国著作権法並びに国際条約により保護されています。