

## ▼ソリタックス-H 輸液 [注]

【重要度】★ 【分類】輸液用電解質液（維持液-高張）

【単位】▼500mL/本

【用法】通常、成人1回500～1000mLを点滴静注する。投与速度は、通常成人1時間あたり4mL/kg以下とする。

【透析患者への投与方法】高カリウム血症の患者には禁忌、腎不全患者では一般的に高カリウム血症になりやすいため慎重投与（1）

【保存期 CKD 患者への投与方法】高カリウム血症の患者には禁忌、腎不全患者では一般的に高カリウム血症になりやすいため慎重投与（1）

【特徴】エネルギー補給効果を高めるためにブドウ糖を12.5%と高く設定し、経口摂取不能または不十分な場合の水分・電解質の補給、維持に用いられる。電解質組成についてはNa, K, Cl, ラクテートとほかにエネルギーが十分補給されるアナボリックな状態時に必要なイオンであるCa, Mg, Pも配合されている。

【備考】ブドウ糖12.5%

【更新日】20180409

※正確な情報を掲載するように努力していますが、その正確性、完全性、適切性についていかなる責任も負わず、いかなる保証もいたしません。本サイトは自己の責任で閲覧・利用することとし、それらを利用した結果、直接または間接的に生じた一切の問題について、当院でいかなる責任も負わないものとします。最新の情報については各薬剤の添付文書やインタビューフォーム等でご確認ください。

※本サイトに掲載の記事・写真などの無断転載・配信を禁じます。すべての内容は、日本国著作権法並びに国際条約により保護されています。