

## ◎大黃甘草湯エキス顆粒 (84) [ツムラ] [内]

【重要度】 【分類】 漢方製剤

【単位】 ◎2.5g/包

【常用量】 7.5g/日

【用法】 分3 [食前又は食間]

【透析患者への投与方法】 減量の必要なし (1)

【保存期腎不全患者への投与方法】 減量の必要なし (1)

【特徴】 便秘症の例に適用. 常習便秘の人が食事をするとすぐ吐く場合に用いる.

【主な副作用・毒性】 偽アルドステロン症, ミオパシー, 下痢

【主な臨床報告】 ルビプロストンより臨床効果が高く副作用が少なく安価 (Yoshida A, et al: Biol Pharm Bull 2019 PMID: 31061310)

【更新日】 20220518

※正確な情報を掲載するように努力していますが、その正確性、完全性、適切性についていかなる責任も負わず、いかなる保証もいたしません。本サイトは自己の責任で閲覧・利用することとし、それらを利用した結果、直接または間接的に生じた一切の問題について、当院でいかなる責任も負わないものとします。最新の情報については各薬剤の添付文書やインタビューフォーム等でご確認ください。

※本サイトに掲載の記事・写真などの無断転載・配信を禁じます。すべての内容は、日本国著作権法並びに国際条約により保護されています。