

---

◎大建中湯エキス顆粒 (100) [ツムラ] [内]

---

【重要度】 【分類】 漢方製剤

【単位】 ◎2.5g/包

【常用量】 15g/日

【用法】 分2～3 [食前または食間]

【透析患者への投与方法】 減量の必要なし (1)

【保存期腎不全患者への投与方法】 減量の必要なし (1)

【特徴】 体力が低下した人で四肢や腹部が冷え、腹痛、腹部膨満感、鼓腸のある場合に用いる。麻痺性イレウスに有効という報告あり。小腸～上行結腸の輸送能を促進させる (Manabe N, et al: Am J Physiol Gastrointest Liver Physiol 298:970-975,2010)

【主な副作用・毒性】 発疹、蕁麻疹、腹痛、下痢

【相互作用】

【更新日】 20210308

---

※正確な情報を掲載するように努力していますが、その正確性、完全性、適切性についていかなる責任も負わず、いかなる保証もいたしません。本サイトは自己の責任で閲覧・利用することとし、それらを利用した結果、直接または間接的に生じた一切の問題について、当院ではいかなる責任も負わないものとします。最新の情報については各薬剤の添付文書やインタビューフォーム等でご確認ください。

※本サイトに掲載の記事・写真などの無断転載・配信を禁じます。すべての内容は、日本国著作権法並びに国際条約により保護されています。