

▼ ダン・リッチ [内] <製造中止>

【重要度】 <製造中止> 【一般製剤名】 特徴参照 【分類】 上気道炎治療剤

【単位】 ▼C

【常用量】 2C

【用法】 分2

【透析患者への投与方法】 透析患者の投与方法に言及した文献はないが、減量の必要ないと思われる (5)

【保存期腎不全患者への投与方法】 腎不全患者の投与方法に言及した文献はないが、減量の必要ないと思われる (5)

【特徴】 ヨウ化イソプロバミド 3.395mg、塩酸フェニルプロパノールアミン 50mg、塩酸ジフェニルピラリン 5mg を含有。気管支痙攣の抑制、末梢血管収縮作用による脱鬱血作用、鎮咳作用がある。抗ヒスタミン作用、毛細血管系の透過性低下作用もある。解熱消炎鎮痛剤は含まない。

【主な副作用・毒性】 無顆粒球症、錯乱、眼圧亢進、血圧上昇、心悸亢進、不整脈、過敏症、排尿困難、溶血性貧血、血小板減少症、消化器症状

【TDM のポイント】 TDM の対象にならない

【備考】 高血圧の患者や脳出血の既往がある患者には禁忌。視調節障害、眠気を催すことがある。

【更新日】 20081118

※正確な情報を掲載するように努力していますが、その正確性、完全性、適切性についていかなる責任も負わず、いかなる保証もいたしません。本サイトは自己の責任で閲覧・利用することとし、それらを利用した結果、直接または間接的に生じた一切の問題について、当院でいかなる責任も負わないものとします。最新の情報については各薬剤の添付文書やインタビューフォーム等でご確認ください。

※本サイトに掲載の記事・写真などの無断転載・配信を禁じます。すべての内容は、日本国著作権法並びに国際条約により保護されています。