

◎デキササルチン口腔用軟膏 [外]

【重要度】 【一般製剤名】 デキサメタゾン dexamethasone 【分類】 口腔粘膜疾患治療剤

【単位】 ◎2g/本 [0.1%]

【用法】 適量を1日1～数回・塗布 [使用後はしばらく飲食を避ける]

【透析患者への投与方法】 減量の必要なし (1)

【保存期腎不全患者への投与方法】 減量の必要なし (1)

【特徴】 口腔粘膜への粘着性、展延性に優れ、使用感が良い。難治性の口内炎、アフタ性口内炎、舌炎に優れた疼痛緩和、抗炎症効果が得られる。ヒドロコルチゾンに比しグルコルチコイド作用が25倍、ミネラルコルチコイド作用はほとんどない。

【主な副作用・毒性】 過敏症、口腔の真菌性及び細菌性感染症、下垂体・副腎皮質系機能の抑制

【更新日】 20121015

※正確な情報を掲載するように努力していますが、その正確性、完全性、適切性についていかなる責任も負わず、いかなる保証もいたしません。本サイトは自己の責任で閲覧・利用することとし、それらを利用した結果、直接または間接的に生じた一切の問題について、当院でいかなる責任も負わないものとします。最新の情報については各薬剤の添付文書やインタビューフォーム等でご確認ください。

※本サイトに掲載の記事・写真などの無断転載・配信を禁じます。すべての内容は、日本国著作権法並びに国際条約により保護されています。