

## ◎トラマゾリン点鼻液0.118%「AFP」 [外]

【重要度】 【一般製剤名】トラマゾリン塩酸塩 tramazoline hydrochloride 【分類】点鼻用血管収縮剤

【単位】◎mL [0.118%, 点鼻容器1本15mL]

【用法】1回2～3滴, 1日数回点鼻または噴霧

【透析患者への投与方法】減量の必要なし (1)

【保存期 CKD 患者への投与方法】減量の必要なし (1)

【特徴】はイミダゾリン系化合物のアドレナリン $\alpha$ 1,  $\alpha$ 2受容体作動薬。局所血管収縮作用を有し, 鼻粘膜の充血を除去することにより鼻閉を軽減。

【主な副作用・毒性】悪心, 乾燥感, 刺激痛, 心悸亢進, 反応性充血, めまい, 頭痛など

【tmax】5min [点鼻] (1)

【代謝】アミン型の代謝物の抱合体に変換 [サル] (1)

【排泄】尿中に代謝物が検出 [サル] (1)

【MW】251.76

【更新日】20151201

※正確な情報を掲載するように努力していますが、その正確性、完全性、適切性についていかなる責任も負わず、いかなる保証もいたしません。本サイトは自己の責任で閲覧・利用することとし、それらを利用した結果、直接または間接的に生じた一切の問題について、当院でいかなる責任も負わないものとします。最新の情報については各薬剤の添付文書やインタビューフォーム等でご確認ください。

※本サイトに掲載の記事・写真などの無断転載・配信を禁じます。すべての内容は、日本国著作権法並びに国際条約により保護されています。