

## △トランコロン錠 [内]

【重要度】 【一般製剤名】メペンゾラート臭化物 (U) mepenzolate bromide 【分類】過敏大腸症治療剤

【単位】△7.5mg/錠

【常用量】45mg/日

【用法】1日3回

【透析患者への投与方法】透析患者の投与方法に言及した文献なし (5)

【保存期 CKD 患者への投与方法】腎不全患者の投与方法に言及した文献なし (5)

【特徴】4級アミンの抗コリン剤で消化管，特に結腸に特異性が高く，下腹部痛を伴った下痢，便秘などの便通異常を訴える過敏性大腸症に用いられる。

【主な副作用・毒性】視調節障害、口渇、排尿困難、胃痛など

【排泄】尿中未変化体排泄率3～22% (U) 3～7% [po] (1)

【MW】420.34

【TDM のポイント】TDM の対象にはならない。循環血中にはごく微量しか吸収されず，体内動態解析が不可能 (1) 【O/W 係数】資料なし (1)

【更新日】20160809

※正確な情報を掲載するように努力していますが、その正確性、完全性、適切性についていかなる責任も負わず、いかなる保証もいたしません。本サイトは自己の責任で閲覧・利用することとし、それらを利用した結果、直接または間接的に生じた一切の問題について、当院でいかなる責任も負わないものとします。最新の情報については各薬剤の添付文書やインタビューフォーム等でご確認ください。

※本サイトに掲載の記事・写真などの無断転載・配信を禁じます。すべての内容は、日本国著作権法並びに国際条約により保護されています。