

▼トレーランG液 75g [内]

【重要度】 【一般製剤名】 デンプン部分加水分解物 【分類】 経口糖耐容力試験用糖質液

【単位】 ▼ブドウ糖 75g 相当瓶 (1 瓶 150mL)

【常用量】 ブドウ糖として 1 回 50~100g, 小児 1.75g/kg

【透析患者への投与方法】 常用量 (1)

【保存期腎不全患者への投与方法】 常用量 (1)

【特徴】 投与後血糖曲線と尿糖をみる試験に使用。ブドウ糖よりも下痢・悪心・嘔吐が少ない。

【主な副作用・毒性】 消化器症状、頭痛

【tmax】 0.5~1hr (1)

【備考】 前日~当日の注意点および判定方法については添付文書参照。

【更新日】 20180530

※正確な情報を掲載するように努力していますが、その正確性、完全性、適切性についていかなる責任も負わず、いかなる保証もいたしません。本サイトは自己の責任で閲覧・利用することとし、それらを利用した結果、直接または間接的に生じた一切の問題について、当院ではいかなる責任も負わないものとします。最新の情報については各薬剤の添付文書やインタビューフォーム等でご確認ください。

※本サイトに掲載の記事・写真などの無断転載・配信を禁じます。すべての内容は、日本国著作権法並びに国際条約により保護されています。