
◎ネリプロクト軟膏 [外]

【重要度】 【一般製剤名】ジフルコルトロン吉草酸エステル+リドカイン **diflucortolone valerate/lidocaine** **【分類】**痔疾用剤**【単位】**◎2g/本**【用法】**1日2回適量を肛門内に注入**【透析患者への投与方法】**常用量 (1)**【保存期 CKD 患者への投与方法】**常用量 (1)**【特徴】**抗炎症作用を有するジフルコルトロン吉草酸エステルに鎮痛作用を有するリドカインを配合した痔疾用剤。ステロイドの強さはvery strongであり、1週間程度の使用に留める。**【主な副作用・毒性】**かゆみ, 刺激感, 下痢, 蕁麻疹**【MW】**478.57**【更新日】**20141222

※正確な情報を掲載するように努力していますが、その正確性、完全性、適切性についていかなる責任も負わず、いかなる保証もいたしません。本サイトは自己の責任で閲覧・利用することとし、それらを利用した結果、直接または間接的に生じた一切の問題について、当院でいかなる責任も負わないものとします。最新の情報については各薬剤の添付文書やインタビューフォーム等でご確認ください。

※本サイトに掲載の記事・写真などの無断転載・配信を禁じます。すべての内容は、日本国著作権法並びに国際条約により保護されています。