

◎ノイキノン錠 [内]

【重要度】 【一般製剤名】 ユビデカレノン ubidecarenone 【分類】 代謝性強心剤

【単位】 ◎10mg/錠

【常用量】 30mg/日

【用法】 分3

【透析患者への投与方法】 減量の必要なし (5)

【その他の報告】 ミトコンドリア機能の改善および酸化ストレスの軽減に大量投与 (1800mg/日) の安全性検証報告 (Yeung CK, et al: BMC Nephrol 16:183, 2015 PMID: 26531095)

【保存期 CKD 患者への投与方法】 減量の必要なし (5)

【特徴】 虚血によってミトコンドリアの電子伝達系に障害が生じた場合にこれを補充する意味で投与され、機能不全に陥った心筋を代謝面から改善する。

【主な副作用・毒性】 胃腸障害, 発疹など

【tmax】 6hr (1)

【代謝】 ω酸化を受けた後β酸化され、抱合体になる (1)

【CL】 $2.46 \pm 1.04 \text{L/hr}$ (1)

【t1/2】 20~30hr (1)

【蛋白結合率】 不明 (1)

【Vd】 不明 (1)

【MW】 863.34

【透析性】 不明 (1)

【TDM のポイント】 TDM の対象にならない

【更新日】 20160816

※正確な情報を掲載するように努力していますが、その正確性、完全性、適切性についていかなる責任も負わず、いかなる保証もいたしません。本サイトは自己の責任で閲覧・利用することとし、それらを利用した結果、直接または間接的に生じた一切の問題について、当院ではいかなる責任も負わないものとします。最新の情報については各薬剤の添付文書やインタビューフォーム等でご確認ください。

※本サイトに掲載の記事・写真などの無断転載・配信を禁じます。すべての内容は、日本国著作権法並びに国際条約により保護されています。