

▼ヒビテン液 [外]

【重要度】 【一般製剤名】 クロルヘキシジングルコン酸塩 chlorhexidine gluconate 【分類】 殺菌消毒剤

【単位】 ▼mL [5%, 1本500mL]

【用法】 0.05～0.5%水溶液、エタノール溶液として消毒に使用

【特徴】 希釈しても消毒力は失われず、速やかな殺菌作用を示し（15～30秒）、消毒後も消毒効果が持続する。皮膚に対する刺激もほとんどないが、まれに過敏症を起こすことがある。難点はグラム陰性菌に対する抗菌力がやや落ちること。石けん類は本剤の殺菌作用を弱めるので、予備洗浄に用いた石けんは十分洗い落としてから使用する。産婦人科用（膣・外陰部の消毒等）、泌尿器科用（膀胱・外性器の消毒等）には使用しない。

【主な副作用・毒性】 ショック、アナフィラキシー、発疹など

【安全性に関する情報】 ショック症状を起こした患者にクロルヘキシジン特異的なIgE抗体が検出された報告あり（1）

【MW】 897.76

【更新日】 20180403

※正確な情報を掲載するように努力していますが、その正確性、完全性、適切性についていかなる責任も負わず、いかなる保証もいたしません。本サイトは自己の責任で閲覧・利用することとし、それらを利用した結果、直接または間接的に生じた一切の問題について、当院ではいかなる責任も負わないものとします。最新の情報については各薬剤の添付文書やインタビューフォーム等でご確認ください。

※本サイトに掲載の記事・写真などの無断転載・配信を禁じます。すべての内容は、日本国著作権法並びに国際条約により保護されています。