

## ▼パスターゼ SA 配合顆粒 [内] &lt;製造中止&gt;

【重要度】 【一般製剤名】1g 中、ピオジアスターゼ 2000 5mg、ニューラーゼ 15mg、セルラーゼ AP3 5mg、プロザイム 6 15mg、膵臓性消化酵素 8AP 40mg 【分類】 消化酵素剤

【単位】 ▼g

【常用量】 0.72g/日

【用法】 分3 食後

【透析患者への投与方法】 減量の必要なし (5)

【保存期 CKD 患者への投与方法】 減量の必要なし (5)

【特徴】 炭水化物、蛋白質及び脂肪の消化を促進する胃溶性及び腸溶性の顆粒配合剤。

【主な副作用・毒性】 過敏症

【更新日】 20200331

※正確な情報を掲載するように努力していますが、その正確性、完全性、適切性についていかなる責任も負わず、いかなる保証もいたしません。本サイトは自己の責任で閲覧・利用することとし、それらを利用した結果、直接または間接的に生じた一切の問題について、当院でいかなる責任も負わないものとします。最新の情報については各薬剤の添付文書やインタビューフォーム等でご確認ください。

※本サイトに掲載の記事・写真などの無断転載・配信を禁じます。すべての内容は、日本国著作権法並びに国際条約により保護されています。