

▼ヒマシ油 [内]

【重要度】 【一般製剤名】 ヒマシ油 castor oil 【分類】 下剤

【単位】 ▼mL

【常用量】 15～30mL [最大 60mL]

【用法】 1回投与

【透析患者への投与方法】 透析患者では腸管内圧上昇による虚血性大腸炎が起こりやすいので、直腸内に硬便のある場合には取り除いてから投与する (5)

【保存期腎不全患者への投与方法】 減量の必要なし (5)

【特徴】 小腸のアルカリ性液中で脂肪分解酵素の作用を受けて、一部分解されグリセリンとリチノール酸になるが、後者は小腸粘膜に対して著しい局所刺激作用を持ち、そのため腸管の蠕動を亢進して瀉下作用を起こさせる。即効性であるので就寝前の服用を避ける。

【主な副作用・毒性】 消化器症状、過敏症

【更新日】 20120809

※正確な情報を掲載するように努力していますが、その正確性、完全性、適切性についていかなる責任も負わず、いかなる保証もいたしません。本サイトは自己の責任で閲覧・利用することとし、それらを利用した結果、直接または間接的に生じた一切の問題について、当院ではいかなる責任も負わないものとします。最新の情報については各薬剤の添付文書やインタビューフォーム等でご確認ください。

※本サイトに掲載の記事・写真などの無断転載・配信を禁じます。すべての内容は、日本国著作権法並びに国際条約により保護されています。