

◎ピオフェルミンR錠 [内]

【重要度】 【一般製剤名】 耐性乳酸菌 antibiotics-resistant lactic acid bacteriae [Streptococcus faecalis] 【分類】 耐性乳酸菌整腸剤

【単位】 ◎6mg/錠

【常用量】 3錠又は3g/日

【用法】 分3, 食後すぐ。[空腹時に服用すると胃酸により失活]

【透析患者への投与方法】 常用量 (5)

【保存期 CKD 患者への投与方法】 常用量 (5)

【特徴】 菌株が腸管内に確実に定着し増殖して乳酸を産生する。腸内腐敗細菌の増殖を抑制し腸蠕動運動を促進させ、腸内細菌叢の異常によって生じた便秘や下痢を改善する。

【主な副作用・毒性】 報告されていない

【排泄】 糞便中 (1)

【更新日】 20190417

※正確な情報を掲載するように努力していますが、その正確性、完全性、適切性についていかなる責任も負わず、いかなる保証もいたしません。本サイトは自己の責任で閲覧・利用することとし、それらを利用した結果、直接または間接的に生じた一切の問題について、当院ではいかなる責任も負わないものとします。最新の情報については各薬剤の添付文書やインタビューフォーム等でご確認ください。

※本サイトに掲載の記事・写真などの無断転載・配信を禁じます。すべての内容は、日本国著作権法並びに国際条約により保護されています。