

## ▼フェリセルツ散20% [内]

【重要度】 【一般製剤名】 クエン酸鉄アンモニウム製剤 ferric ammonium citrate 【分類】 MRI 用経口消化管造影剤

【単位】 ▼600mg/包 (1包3g)

【常用量】 1包 (必要に応じて2包まで増量する)

【用法】 1包を300mLの水に溶かし経口投与する

【透析患者への投与方法】 減量の必要なし (5)

【保存期 CKD 患者への投与方法】 減量の必要なし (5)

【特徴】 磁気共鳴現象において緩和時間短縮効果を有し、消化管とその周辺臓器のコントラストを増強する。

【主な副作用・毒性】 下痢、発疹、アレルギー反応、胸やけ、肩痛、血清鉄低下、血清フェリチン増加、血小板増多、総ビリルビン上昇、血清K上昇など

【相互作用】 テトラサイクリン系抗生物質、ニューキノロン系経口抗菌剤、セフジニルの吸収を阻害するため3hr以上空ける (1)

【備考】 通常本剤服用後、造影効果は約20分後まで持続するが胃内通過時間は個人によって大きく異なることがあるので注意。便が黒色を呈することがある。一過性に歯や舌が着色することがある。

【更新日】 20150224

※正確な情報を掲載するように努力していますが、その正確性、完全性、適切性についていかなる責任も負わず、いかなる保証もいたしません。本サイトは自己の責任で閲覧・利用することとし、それらを利用した結果、直接または間接的に生じた一切の問題について、当院でいかなる責任も負わないものとします。最新の情報については各薬剤の添付文書やインタビューフォーム等でご確認ください。

※本サイトに掲載の記事・写真などの無断転載・配信を禁じます。すべての内容は、日本国著作権法並びに国際条約により保護されています。