

○アミュー配合顆粒 [内]

【重要度】 【分類】 腎不全用必須アミノ酸製剤

【単位】 ○2.5g/包

【常用量】 3包/日

【用法】 1日3回毎食後

【透析患者への投与方法】 減量の必要なし (5)

【保存期 CKD 患者への投与方法】 減量の必要なし (5) 低蛋白、高カロリー食下でうまく活用すれば BUN が下がり血清総蛋白やアルブミンが増加し、透析導入までの期間の延長が期待できる。しかしアルギニンが全く含まれていないため、本剤を唯一の窒素源とした場合には代謝性アシドーシスや高アンモニウム血症による意識障害などの副作用を起こす可能性がある (5)

【特徴】 慢性腎不全時のアミノ酸補給に適用。慢性腎不全患者に対して血中 BUN/Cre 比を低下させ、血清総蛋白およびアルブミン、ヘモグロビンを増加させる。

【主な副作用・毒性】 過敏症、悪心、嘔吐、食欲不振、口内不快感、腹部膨満、下痢、便秘、肝障害、BUN の上昇など

【備考】 含有アミノ酸量は2123.6mg/包。イソロイシン、ロイシン、リジン、メチオニン、フェニルアラニン、トレオニン、トリプトファン、バリン、ヒスチジン含有

【更新日】 20141220

※正確な情報を掲載するように努力していますが、その正確性、完全性、適切性についていかなる責任も負わず、いかなる保証もいたしません。本サイトは自己の責任で閲覧・利用することとし、それらを利用した結果、直接または間接的に生じた一切の問題について、当院でいかなる責任も負わないものとします。最新の情報については各薬剤の添付文書やインタビューフォーム等でご確認ください。

※本サイトに掲載の記事・写真などの無断転載・配信を禁じます。すべての内容は、日本国著作権法並びに国際条約により保護されています。