

◎複方ヨードグリセリン [外]

【重要度】 【一般製剤名】複方ヨードグリセリン compound iodine glycerin 【分類】口腔用剤

【単位】◎mL

【用法】咽頭炎・喉頭炎・扁桃炎に対して、症状に応じ適宜適量を患部に塗布

【透析患者への投与方法】常用量 (5)

【保存期 CKD 患者への投与方法】常用量 (5)

【特徴】殺菌・消毒以外にコバセドウ病の甲状腺亜全摘術時の術前処置として抗甲状腺薬に併用される。甲状腺に対して血管増生抑制作用及び硬度増加作用を持つヨード製剤として術前 10～14 日間に服用投与される。

【主な副作用・毒性】アナフィラキシー、過敏症、甲状腺機能異常

【備考】別名：ルゴール液

【更新日】20141220

※正確な情報を掲載するように努力していますが、その正確性、完全性、適切性についていかなる責任も負わず、いかなる保証もいたしません。本サイトは自己の責任で閲覧・利用することとし、それらを利用した結果、直接または間接的に生じた一切の問題について、当院でいかなる責任も負わないものとします。最新の情報については各薬剤の添付文書やインタビューフォーム等でご確認ください。

※本サイトに掲載の記事・写真などの無断転載・配信を禁じます。すべての内容は、日本国著作権法並びに国際条約により保護されています。