

○フルメトロン点眼液 [外]

【重要度】 【一般製剤名】フルオロメトロン (U) fluorometholone 【分類】抗炎症ステロイド水性懸濁点眼剤

【単位】○0.02%・△0.1% [1本5mL]

【常用量】1日2～4回(増減)

【用法】用時よく振り混ぜ点眼

【特徴】水性の懸濁性合成副腎皮質ステロイド点眼剤。他のステロイド点眼剤に比べ眼圧への影響が少なく、抗炎症性の眼疾患に効果を発揮する。

【主な副作用・毒性】眼瞼炎、発疹、刺激感、結膜充血、角膜沈着物〔添加物のリン酸塩による〕など

【モニターすべき項目】眼科的検査

【MW】376.46

【更新日】20191127

※正確な情報を掲載するように努力していますが、その正確性、完全性、適切性についていかなる責任も負わず、いかなる保証もいたしません。本サイトは自己の責任で閲覧・利用することとし、それらを利用した結果、直接または間接的に生じた一切の問題について、当院でいかなる責任も負わないものとします。最新の情報については各薬剤の添付文書やインタビューフォーム等でご確認ください。

※本サイトに掲載の記事・写真などの無断転載・配信を禁じます。すべての内容は、日本国著作権法並びに国際条約により保護されています。