

○ブドウ糖 [内]

【重要度】 【一般製剤名】ブドウ糖 glucose 【分類】栄養補給薬

【単位】〇g

【常用量】経口的栄養補給には、必要量を粉末あるいは水溶液として経口投与。OGTTには1回50～100g

【用法】粉末あるいは水溶液として投与

【透析患者への投与方法】減量の必要なし (5)

【保存期腎不全患者への投与方法】減量の必要なし (5)

【主な副作用・毒性】消化器症状

【MW】180.16

【備考】経口栄養補給目的のブドウ糖は水道水で激しく振とうして溶解し、透明の溶液とする。40g/80mL/日(分2)として6日分作成(500mL投薬瓶)した症例がある (5)

【更新日】20190304

※正確な情報を掲載するように努力していますが、その正確性、完全性、適切性についていかなる責任も負わず、いかなる保証もいたしません。本サイトは自己の責任で閲覧・利用することとし、それらを利用した結果、直接または間接的に生じた一切の問題について、当院ではいかなる責任も負わないものとします。最新の情報については各薬剤の添付文書やインタビューフォーム等でご確認ください。

※本サイトに掲載の記事・写真などの無断転載・配信を禁じます。すべての内容は、日本国著作権法並びに国際条約により保護されています。