

△プロクトセディル坐薬・△軟膏 [外]

【重要度】 【一般製剤名】特徴参照 【分類】痔疾治療剤

【単位】△個, △2g/個 (軟膏)

【常用量】1回1個

【用法】1日1～3回

【透析患者への投与方法】減量の必要なし (1)

【保存期腎不全患者への投与方法】減量の必要なし (1)

【特徴】1個中にヒドロコルチゾン5mg、硫酸フラジオマイシン7.1mg (力価)、塩酸ジブカイン5mg、エスクロシド10mg含有。抗炎症 (ヒドロコルチゾン)、抗菌 (硫酸フラジオマイシン)、鎮痛 (塩酸ジブカイン)、止血 (エスクロシド) の4つの作用をあわせもつ。

【主な副作用・毒性】下垂体・副腎皮質系機能抑制 (大量又は長期)、カンジダ症、皮膚刺激感

【更新日】20201223

※正確な情報を掲載するように努力していますが、その正確性、完全性、適切性についていかなる責任も負わず、いかなる保証もいたしません。本サイトは自己の責任で閲覧・利用することとし、それらを利用した結果、直接または間接的に生じた一切の問題について、当院でいかなる責任も負わないものとします。最新の情報については各薬剤の添付文書やインタビューフォーム等でご確認ください。

※本サイトに掲載の記事・写真などの無断転載・配信を禁じます。すべての内容は、日本国著作権法並びに国際条約により保護されています。