

▼ベノキシール点眼液 [外]

【重要度】 【一般製剤名】 オキシブプロカイン塩酸塩 oxybuprocaine hydrochloride 【分類】 眼科用表面麻酔剤

【単位】 ▼5mL/本 [0.4%]

【用法】 通常成人では1～4滴を点眼する。

【透析患者への投与方法】 常用量 (1)

【保存期 CKD 患者への投与方法】 常用量 (1)

【特徴】 麻酔効果の発現が迅速 (1 滴点眼後 10～20 秒) で、効果持続時間が比較的短い (平均 14 分間)。瞳孔径、調節能、光覚、眼圧等に影響が少ない。

【主な副作用・毒性】 ショック、アナフィラキシー様症状、搔痒感、角膜障害、結膜充血、眼瞼発赤

【MW】 344.88

【pKa】 2.0, 7.7 (1)

【備考】 鎮痛のみの目的には使用しないこと。患者には渡さないこと。頻回に使用しないこと (角膜障害をおこすことがある)。注射用として使用しないこと。

【更新日】 20180409

※正確な情報を掲載するように努力していますが、その正確性、完全性、適切性についていかなる責任も負わず、いかなる保証もいたしません。本サイトは自己の責任で閲覧・利用することとし、それらを利用した結果、直接または間接的に生じた一切の問題について、当院ではいかなる責任も負わないものとします。最新の情報については各薬剤の添付文書やインタビューフォーム等でご確認ください。

※本サイトに掲載の記事・写真などの無断転載・配信を禁じます。すべての内容は、日本国著作権法並びに国際条約により保護されています。