
△EPL カプセル [内]

【重要度】 【一般製剤名】 ポリエンホスファチジルコリン polyenephosphatidyl choline 【分類】 脂質代謝改善剤

【単位】 △250mg/Cap

【常用量】 1500mg/日

【用法】 分3

【透析患者への投与方法】 減量の必要はないと思われるが、投与方法に言及した文献なし (5)

【保存期 CKD 患者への投与方法】 減量の必要はないと思われるが、投与方法に言及した文献なし (5)

【特徴】 不飽和脂肪酸、リノール酸 (70%)、リノレイン酸、オレイン酸を含有。肝障害時に細胞内で起こる脂質代謝異常 (リノール酸、アラキドン酸の減少) を改善し、糖代謝・蛋白代謝、排泄機能等の各種細胞機能を改善する。

【主な副作用・毒性】 下痢、腹部膨満感、過敏症など

【排泄】 糞便中排泄 (1)

【TDM のポイント】 TDM の対象にはならない

【備考】 手術前の休薬の指定なし。

【更新日】 20170412

※正確な情報を掲載するように努力していますが、その正確性、完全性、適切性についていかなる責任も負わず、いかなる保証もいたしません。本サイトは自己の責任で閲覧・利用することとし、それらを利用した結果、直接または間接的に生じた一切の問題について、当院でいかなる責任も負わないものとします。最新の情報については各薬剤の添付文書やインタビューフォーム等でご確認ください。

※本サイトに掲載の記事・写真などの無断転載・配信を禁じます。すべての内容は、日本国著作権法並びに国際条約により保護されています。