

○ボンアルファ軟膏 [外]

【重要度】 【一般製剤名】 タカルシトール tacalcitol 【分類】 活性型VD3 角化症治療剤

【単位】 ○10g/本 [2 μ g/g]

【用法】 1日2回適量を患部に塗布

【透析患者への投与方法】 血清Ca値に注意して使用 (1)

【保存期腎不全患者への投与方法】 血清Ca値に注意して使用 (1)

【特徴】 乾癬に対する効果は各種ステロイド外用剤とほぼ同等の1 α -OHビタミンD3製剤。表皮細胞の増殖抑制作用、分化誘導作用により、角化異常における表皮細胞の増殖亢進、分化異常を改善する。

【主な副作用・毒性】 頭痛、ヒリヒリ感、接触性皮膚炎、掻痒、腫脹、肝機能障害、白血球の増多、血清リンの低下

【排泄】 尿中に15%回収 [ラット] (1)

【MW】 434.66

【OW係数】 有機層に分配 (1)

【更新日】 20121016

※正確な情報を掲載するように努力していますが、その正確性、完全性、適切性についていかなる責任も負わず、いかなる保証もいたしません。本サイトは自己の責任で閲覧・利用することとし、それらを利用した結果、直接または間接的に生じた一切の問題について、当院でいかなる責任も負わないものとします。最新の情報については各薬剤の添付文書やインタビューフォーム等でご確認ください。

※本サイトに掲載の記事・写真などの無断転載・配信を禁じます。すべての内容は、日本国著作権法並びに国際条約により保護されています。