
△麻杏甘石湯エキス顆粒 (55) ツムラ [内]

【重要度】 **【分類】** 漢方製剤**【単位】** △2.5g/日**【常用量】** 7.5g/日**【用法】** 分3 [食前又は食間]**【透析患者への投与方法】** 減量の必要なし (5)**【保存期 CKD 患者への投与方法】** 減量の必要なし (5)**【特徴】** 麻黄・杏仁は血行を盛んにして水分の停滞を疎通し、咳嗽を治す。石膏は麻黄・杏仁と協力して解熱・鎮痛の効果がある。甘草は諸薬を調和してその薬効を助ける。小児喘息、気管支喘息に用いられる。**【主な副作用・毒性】** 偽アルドステロン症 (高血圧, 浮腫), 胃部不快感**【更新日】** 20200812

※正確な情報を掲載するように努力していますが、その正確性、完全性、適切性についていかなる責任も負わず、いかなる保証もいたしません。本サイトは自己の責任で閲覧・利用することとし、それらを利用した結果、直接または間接的に生じた一切の問題について、当院ではいかなる責任も負わないものとします。最新の情報については各薬剤の添付文書やインタビューフォーム等でご確認ください。

※本サイトに掲載の記事・写真などの無断転載・配信を禁じます。すべての内容は、日本国著作権法並びに国際条約により保護されています。