

▼マルタミン注射用 [注]

【重要度】 【分類】 高カロリー輸液用総合ビタミン剤

【単位】 ▼V

【常用量】 1日 1V

【用法】 点滴静注 [DEHP free]

【透析患者への投与方法】 減量の必要はないが、ビタミンAの蓄積に要注意 (5)

【保存期 CKD患者への投与方法】 Ccr>50mL/min : 減量の必要なし, Ccr 10~50mL/min : 減量の必要なし, Ccr<10mL/min : 減量の必要はないが、ビタミンAの蓄積に要注意 (5)

【特徴】 13種のビタミンを1容器にまとめた製剤。TPN施行患者のビタミン類の維持・改善に用いる。

【主な副作用・毒性】 過敏症, 消化器症状

【TDMのポイント】 TDMの対象にはならない

【備考】 アミノ酸製剤とのみ混合した場合、ビタミンの分解が促進されることがある (1)

【更新日】 20151203

※正確な情報を掲載するように努力していますが、その正確性、完全性、適切性についていかなる責任も負わず、いかなる保証もいたしません。本サイトは自己の責任で閲覧・利用することとし、それらを利用した結果、直接または間接的に生じた一切の問題について、当院でいかなる責任も負わないものとします。最新の情報については各薬剤の添付文書やインタビューフォーム等でご確認ください。

※本サイトに掲載の記事・写真などの無断転載・配信を禁じます。すべての内容は、日本国著作権法並びに国際条約により保護されています。