

◎ユーロジン錠 [内]

- 【重要度】 【一般製剤名】 エスタゾラム (U) estazolam 【分類】 睡眠導入剤 [BZ系・中間型]
- 【単位】 ◎1mg・▼2mg/錠
- 【常用量】 1~4mg
- 【用法】 分1眼前
- 【透析患者への投与方法】 減量の必要なし (5)
- 【保存期 CKD 患者への投与方法】 減量の必要なし (12)
- 【特徴】 消失半減期が約24時間と中間作用型。臓器毒性が低く、耐性も生じにくく、依存も形成されにくい。反面、眠気、倦怠感、ふらつき等を翌朝まで持ち越すことがある。
- 【主な副作用・毒性】 依存性、禁断症状、奇異反応 (分裂病)、眠気、運動失調、肝・腎障害、CO₂ ナルコーシス、汎血球減少、味覚異常など
- 【F】 98% [マウス] (1)
- 【tmax】 4.9±2.3hr (1) 0.5~6hr (U)
- 【代謝】 酸化及び水酸化され非活性代謝物・またはほとんど活性のない代謝物になる (1,U)
- 【排泄】 尿中未変化体排泄率 3.6% [72hr まで] (1) 【CL】 0.24±0.04mL/min/kg [po] (1)
- 【t1/2】 10~24hr (U) 8~24hr (12)
- 【蛋白結合率】 80.2% [ラット] (1) 93% (U,12)
- 【Vd】 データなし (12) Vd/F=0.57±0.16L/kg (1)
- 【MW】 294.74
- 【透析性】 透析性は低いと思われる (5)
- 【TDM のポイント】 TDM の対象にならない 【O/W 係数】 ∞ [クロロホルム系] (1) 【pKa】 2.84 (1)
- 【効果発現時間】 28±12min (1)
- 【効果持続時間】 4.8±1.7hr (1)
- 【備考】 長期投与に際しては定期的に肝機能、腎機能、血液等の検査を行うことが望ましい (1)
- 【更新日】 20170819

※正確な情報を掲載するように努力していますが、その正確性、完全性、適切性についていかなる責任も負わず、いかなる保証もいたしません。本サイトは自己の責任で閲覧・利用することとし、それらを利用した結果、直接または間接的に生じた一切の問題について、当院でいかなる責任も負わないものとします。最新の情報については各薬剤の添付文書やインタビューフォーム等でご確認ください。

※本サイトに掲載の記事・写真などの無断転載・配信を禁じます。すべての内容は、日本国著作権法並びに国際条約により保護されています。