

◎アルツディスポ関節注 [注]

- 【重要度】 【一般製剤名】 ヒアルロン酸ナトリウム hyaluronate sodium 【分類】 関節機能改善剤
- 【単位】 ◎25mg/筒 (1筒 2.5mL)
- 【常用量】 1回 25mg を1週間ごとに連続5回膝関節腔内又は肩関節内に投与
- 【用法】 膝関節・肩関節内に投与
- 【透析患者への投与方法】 減量の必要なし (5)
- 【保存期 CKD 患者への投与方法】 減量の必要なし (5)
- 【特徴】 有効成分であるヒアルロン酸は関節液の主要成分であり、その特有の保水性と粘弾性により関節の潤滑能を改善。また関節軟骨表面を被覆し、軟骨表面を保護。
- 【主な副作用・毒性】 関節血腫、関節水腫、静脈炎
- 【tmax】 48hr [ウサギ] (1)
- 【代謝】 一部が低分子化され、肝代謝 [ウサギ] (1)
- 【排泄】 低分子化合物として主に呼気中に排泄され、尿中回収率は5% [ウサギ] (1)
- 【蛋白結合率】 結合しない (1)
- 【MW】 平均 50 万～120 万
- 【透析性】 資料なし (1) 高分子であれは除去されない (5)
- 【pKa】 2.77～2.97 (1) 【O/W 係数】 資料なし (1)
- 【更新日】 20140320

※正確な情報を掲載するように努力していますが、その正確性、完全性、適切性についていかなる責任も負わず、いかなる保証もいたしません。本サイトは自己の責任で閲覧・利用することとし、それらを利用した結果、直接または間接的に生じた一切の問題について、当院ではいかなる責任も負わないものとします。最新の情報については各薬剤の添付文書やインタビューフォーム等でご確認ください。

※本サイトに掲載の記事・写真などの無断転載・配信を禁じます。すべての内容は、日本国著作権法並びに国際条約により保護されています。