
◎ラクトリンゲル液, ▼ハルトマン液, ▼ラクテック輸液 [注]

【重要度】 【一般製剤名】 乳酸リンゲル lactated Ringer' s solution 【分類】 乳酸ナトリウム加里ンゲル液

【単位】 ▼200・◎500・▼1000mL/袋

【常用量】 1回 500～1000mL

【用法】 点滴静注

【透析患者への投与方法】 減量の必要ないが、Na 貯留と水分投与量に注意する (5)

【保存期腎不全患者への投与方法】 減量の必要なし (5)

【特徴】 細胞外液の電解質組成に近似している。乳酸は、代謝されて HCO₃⁻ になってアシドーシスを補正する。ショック時の血圧低下や、酸塩基平衡を改善する。細胞外液の欠乏時には細胞外液補給剤としての役割を果たす。

【主な副作用・毒性】 浮腫、過敏症

【更新日】 20160813

※正確な情報を掲載するように努力していますが、その正確性、完全性、適切性についていかなる責任も負わず、いかなる保証もいたしません。本サイトは自己の責任で閲覧・利用することとし、それらを利用した結果、直接または間接的に生じた一切の問題について、当院ではいかなる責任も負わないものとします。最新の情報については各薬剤の添付文書やインタビューフォーム等でご確認ください。

※本サイトに掲載の記事・写真などの無断転載・配信を禁じます。すべての内容は、日本国著作権法並びに国際条約により保護されています。