

◎新レシカルボン坐剤 [外]

【重要度】 【一般製剤名】炭酸水素ナトリウム+無水リン酸二水素ナトリウム (U) 【分類】便秘治療剤

【単位】◎個

【常用量】1回1~2個

【用法】肛門内に挿入

【透析患者への投与方法】減量の必要なし (5)

【保存期 CKD 患者への投与方法】減量の必要なし (5)

【特徴】1個に炭酸水素ナトリウム0.5g, 無水リン酸二水素ナトリウム0.68g含有。腸内で炭酸ガスを徐々に発生し、大腸の蠕動運動を誘発する。病床者、小児、妊産婦にも使用できる。1個で約110mLの二酸化炭素が発生し、効果発現まで20~30分かかる。挿入後は便意を感じるまで座位か立位の方が効果が高いという報告もある(日病薬誌 36: 33-35, 2000)。

【主な副作用・毒性】ショック, 刺激感, 下腹部痛

【効果発現時間】5~30min

【更新日】20150812

※正確な情報を掲載するように努力していますが、その正確性、完全性、適切性についていかなる責任も負わず、いかなる保証もいたしません。本サイトは自己の責任で閲覧・利用することとし、それらを利用した結果、直接または間接的に生じた一切の問題について、当院でいかなる責任も負わないものとします。最新の情報については各薬剤の添付文書やインタビューフォーム等でご確認ください。

※本サイトに掲載の記事・写真などの無断転載・配信を禁じます。すべての内容は、日本国著作権法並びに国際条約により保護されています。