

◎レスタミンコーワクリーム [外]

【重要度】 【一般製剤名】ジフェンヒドラミン diphenhydramine 【分類】アレルギー性疾患外用治療剤
【単位】◎g [1%] (単剤の場合, 20g もしくは50g で処方)
【用法】1日1~数回・塗布又は塗擦
【透析患者への投与方法】常用量 (1)
【保存期 CKD 患者への投与方法】常用量 (1)
【特徴】かゆみ止めの軟膏. 抗ヒスタミン剤のジフェンヒドラミンの量は強力レスタミンコーワチゾン軟膏の10倍含有.
【主な副作用・毒性】皮膚の発赤, 腫脹, そう痒感, 湿潤などの過敏症
【F】50% [po] (14)
【排泄】尿中未変化体排泄率3% (14)
【t1/2】平均3.3hr [2.4~8hr] (11) 5.2hr (14)
【蛋白結合率】85~98% (11)
【Vd】3.28L/kg (11) 3.7L/kg (14)
【MW】255.35
【O/W 係数】2000 (11)
【備考】眼の周囲には使用しない.
【更新日】20180502

※正確な情報を掲載するように努力していますが、その正確性、完全性、適切性についていかなる責任も負わず、いかなる保証もいたしません。本サイトは自己の責任で閲覧・利用することとし、それらを利用した結果、直接または間接的に生じた一切の問題について、当院でいかなる責任も負わないものとします。最新の情報については各薬剤の添付文書やインタビューフォーム等でご確認ください。

※本サイトに掲載の記事・写真などの無断転載・配信を禁じます。すべての内容は、日本国著作権法並びに国際条約により保護されています。