

## ▼アレベール吸入用溶解液 [外]

【重要度】 【一般製剤名】チロキサポール tyloxapol 【分類】呼吸器官用吸入剤

【単位】▼0.125% [1本100mL]

【用法】1～5mLに呼吸器用剤を用時混合して噴霧吸入

【透析患者への投与方法】減量の必要なし (5)

【保存期 CKD 患者への投与方法】減量の必要なし (5)

【特徴】界面活性作用も有し、痰の表面張力をさげ、粘着力を減少させる。均一粒子のエアロゾルを形成し蒸発を抑制するため滞留時間が長く、吸入用薬剤の溶解剤として有効性が高い。アルカリ性が強く肺包内表面活性物質を不活化する。

【主な副作用・毒性】嘔気、上気道の刺激症状、発疹

【備考】冷所保存を厳守し、開封後14日以内に廃棄。

【更新日】20180410

※正確な情報を掲載するように努力していますが、その正確性、完全性、適切性についていかなる責任も負わず、いかなる保証もいたしません。本サイトは自己の責任で閲覧・利用することとし、それらを利用した結果、直接または間接的に生じた一切の問題について、当院でいかなる責任も負わないものとします。最新の情報については各薬剤の添付文書やインタビューフォーム等でご確認ください。

※本サイトに掲載の記事・写真などの無断転載・配信を禁じます。すべての内容は、日本国著作権法並びに国際条約により保護されています。