

◎モーラステープ・△テープL・△パップ [外]

【重要度】 【一般製剤名】ケトプロフェン Ketoprofen 【分類】経皮鎮痛消炎剤

【単位】◎テープ20mg・テープL40mg (7枚袋), △パップ30mg・△60mg (7枚袋)

【用法】テープ:1日1回, ハップ:1日2回

【特徴】ケトプロフェン含有貼付剤。

【主な副作用・毒性】ショック・アナフィラキシー, 気管支喘息, 接触性皮膚炎, 光線過敏症 (4週間は紫外線注意)

【安全性に関する情報】1日8枚 (160mg) 貼付を継続して下部消化管出血を来した症例 (Hirose S, et al: Scand J Gastroenterol. 2018 PMID: 29043859) 40mgを毎日4~6枚使用が胃潰瘍に関連したと考えられた症例 (木本正英, 他: 日本プライマリ・ケア連合学会誌 42: 158-161, 2019)

【吸収】皮膚透過量: テープ剤はパップ剤の5倍 (1)

【更新日】20230508

※正確な情報を掲載するように努力していますが、その正確性、完全性、適切性についていかなる責任も負わず、いかなる保証もいたしません。本サイトは自己の責任で閲覧・利用することとし、それらを利用した結果、直接または間接的に生じた一切の問題について、当院でいかなる責任も負わないものとします。最新の情報については各薬剤の添付文書やインタビューフォーム等でご確認ください。

※本サイトに掲載の記事・写真などの無断転載・配信を禁じます。すべての内容は、日本国著作権法並びに国際条約により保護されています。