

## ◎通導散エキス顆粒 (105) [ツムラ] [内]

【重要度】 【分類】 漢方製剤

【単位】 ◎2.5g/包

【常用量】 7.5g/日

【用法】 分3 [食前又は食間]

【透析患者への投与方法】 常用量 (1)

【保存期 CKD 患者への投与方法】 常用量 (1)

【特徴】 いわゆる血の治療剤で、比較的体力があり下腹部に圧痛があつて便秘しがちな月経不順、月経痛、更年期障害、腹痛、便秘、打撲、高血圧の随伴症状（頭痛、眩暈、肩こり）に用いる。

【主な副作用・毒性】 偽アルドステロン症、ミオパシー、消化器症状、肝機能障害

【更新日】 20151130

※正確な情報を掲載するように努力していますが、その正確性、完全性、適切性についていかなる責任も負わず、いかなる保証もいたしません。本サイトは自己の責任で閲覧・利用することとし、それらを利用した結果、直接または間接的に生じた一切の問題について、当院でいかなる責任も負わないものとします。最新の情報については各薬剤の添付文書やインタビューフォーム等でご確認ください。

※本サイトに掲載の記事・写真などの無断転載・配信を禁じます。すべての内容は、日本国著作権法並びに国際条約により保護されています。